



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения** К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

(21) 1801184

(22) 05.03.2018

(46) Бюл.137, 2017

(71) Исмонов С.С.(ТJ).

(72) Исмонов С.С.(ТJ).

(73) Исмонов С.С.(ТJ).

(54) **СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ**

ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ И

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАСТВОРА ДЕМЕКСИДА В ПРОЦЕССЕ

ЛЕКАРСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА.

(56) 1. «Руководство по лечению внутренних болезней» под ред. Проф. Окорокова А.Н.

(57) Изобретение относится к медицине, в частности, к физиотерапии и предлагается как способ лечения в общей медицинской практике с использованием раствора димексида в процессе лекарственного электрофореза.

Суть способа заключается в том, что для получения раствора димексида с концентрацией 5-

10% к стандартному 99% раствору димексида добавляют 0,2% раствор калия хлорида и получают образовавшийся раствор в разных объемах. В полученном растворе появление электропроводности раствора димексида происходит за счет образования сольватных ионов с превосходством положительных ионов в данном средстве. Это электрофоретическое явление способствует тому, что повышается электропроводность раствора димексида и его эффективность в процессе лекарственного электрофореза. В процессе образования сольватированных ионов (положительных и отрицательных), окружающих биполярную молекулу димексида, образуется система, состоящая из неровных количеств положительных и отрицательных заряженных конгломератов с преимуществом положительного заряда, относящихся к одному концу (элементу калия).

Изобретение относится к медицине, в частности, к физиотерапии и предлагается как способ лечения в общей медицинской практике с использованием раствора димексид в процессе лекарственного электрофореза.

Лекарственные растворы, применяемые для электрофореза, готовятся на дистиллированной воде. При этом нужно отметить, что дистиллированная вода используется как растворитель для приготовления всех видов и концентраций водных растворов, используемых в электрофорезе.

На сегодняшний день наукой доказано, что раствор димексид можно использовать в качестве средства при лекарственном электрофорезе.

В качестве прототипа выбран метод применения стандартного 99% раствора димексид с разными концентрациями, разведенного дистиллированной водой, но наиболее часто для выполнения данной процедуры применяют слабые концентрации (5%-10%) раствора димексид. Именно раствор димексид данной концентрации нашел наиболее широкое применение в медицинской практике[1].

Недостаток существующего метода применения раствора димексид при использовании его в качестве средства в процессе лекарственного электрофореза заключается в следующем: использование данного средства в лечебной практике остается не до конца научно обоснованным, так как при этом не образуются активные биполярные ионы димексид в данном растворе, и димексид остается электронеутральным, где в электрическом поле ведет себя как цвиттер - сольватированный и неактивный ион, который не способен передвигаться к какому-нибудь электрическому полюсу во время проведения лекарственного электрофореза.

Цель предложенного изобретения направлена на решение задач: обеспечение электропроводимости и повышения эффективности действия раствора димексид, и усиление его терапевтического действия в процессе лекарственного электрофореза.

Поставленная цель достигается тем, что для улучшения электропроводимости и повышения эффективности раствора димексид к нему добавляется раствор калия хлорида.

Сущность изобретения заключается в том, что для получения раствора димексид с концентрацией (5-10%) к стандартному 99% раствору димексид добавляют 0,2% раствор калия хлорида и получают образовавшийся раствор в разных объемах. В полученном растворе появление электропроводимости раствора димексид происходит за счет образования сольватных ионов с превосходством положительных ионов в данном средстве. Это электрофоретическое явление способствует тому, что повышается электропроводимость раствора

димексид и его эффективность в процессе лекарственного электрофореза. В процессе образования сольватированных ионов (положительных и отрицательных), окружающих биполярную молекулу димексид, образуется система, состоящая из неровных количеств положительных и отрицательных заряженных конгломератов с преимуществом положительного заряда, относящихся к одному концу (элементу калия).

Данный способ обеспечивает улучшение электропроводимости и повышение эффективности действия раствора димексид, и усиление его терапевтического действия в процессе лекарственного электрофореза.

Способ приготовления применяемого раствора. Для использования раствора димексид в лекарственном электрофорезе, и для получения раствора димексид с нужной концентрацией 5-10%, к стандартному 99% раствору димексид добавляют 0,2% раствор калия хлорида и получают образовавшийся раствор в разных объемах. Для получения нужного объема и концентрации раствора димексид с хлоридом калия поступают следующим образом:

Лекарственные растворы, применяемые для электрофореза, готовятся на дистиллированной воде. Для получения композиции состоящий из 10 % раствора димексид и 0,2% раствора калия хлорида, используемого для электрофореза, выполняют следующую процедуру: для изготовления 200,0мл вышеназванной композиции берут 171,0 мл. дис.воды, 18,5 мл 99% водного раствора димексид и 10,0 мл 4% раствора калия хлорида.

Пример 1. Больной К., 1963 г.р с диагнозом: Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника с корешковым синдромом. Жалобы больного на боли жгучего характера в пояснично-крестцовом отделе с иррадиацией в нижних конечностях, с ограничением подвижности в пояснично-крестцовом отделе, трудности при ходьбе. Больному после проведения общепринятой медикаментозной терапии и неудовлетворительного эффекта от него было назначено курс из 10 процедур электрофореза с раствором димексид 10% (+) на пояснично-крестцовый отдел позвоночника и 2,4 % раствора эуффилина(-) на область обоих икроножных мышц. Время экспозиции составил от 15 до 20 минут ежедневно, курс лечения -10 процедур. После принятия процедур больной избавился от болей и скованность в пояснице, боли иррадирующего характера в нижних конечностях исчезли.

Пример 2. Больной С., 1967 г.р с диагнозом: Пояснично-крестцовый радикулит с корешковым синдромом. Жалобы на боли иррадирующего характера в нижние конечности, в частности в правую ногу. Больному после проведения

общепринятой медикаментозной терапии и
5

сохранением жалоб было назначено курс из 10
911 6

процедур электрофореза с раствором димексида 10 % (+) на пояснично-крестцовый отдел позвоночника и 2,4% раствора эуфиллина(-) на область правой икроножной мышцы. Время экспозиции составил от 15 до 20 минут ежедневно, курс лечения -10 процедур. После принятия процедур больной полностью избавился от имеющихся жалоб, исчезли боли иррадиирующего характера, восстановился прежний ритм хождения.

Исходя из этого, можно заявить, что данный способ использования раствора димексида, предлагается как метод физиотерапевтического лечения при проведении лекарственного электрофореза и его применение будет основано на научных фактах правильности и целесообразности данного способа.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ улучшения электропроводимости и повышения эффективности раствора димексида в процессе лекарственного электрофореза включающий разведение раствора димексида

дистиллированной водой и получение раствора слабой концентрации 5-10% **отличающийся тем, что** в него добавляют 0,2% раствор калия хлорида.

Компьютерный набор: Фатхуллова М.С.

Заказ

Тираж

Подписное

Национальный патентно-информационный центр РТ
734042, г. Душанбе, ул. Айни, 14а