



Республика Таджикистан
К36/00;

(19) **TJ** (11) **976**
(51) **МПК А61**

А61 К33/00; А61 К33/30;

А61 Р17/04

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения** К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

(21) 1801248

(22) 30.10.2018

(46) Бюл.145, 2018

(71) Юсуфи С.Дж. (ТJ);

Давлатмамадова М.М. (ТJ).

(72) Юсуфи С.Дж. (ТJ); Давлатмамадова М.М.

(ТJ); Джабборов С.С. (ТJ).

(73) Юсуфи С.Дж. (ТJ); Давлатмамадова М.М.

(ТJ); Джабборов С.С. (ТJ).

(54) **СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ.**

(56) 1. Атопический дерматит // Клинические
рекомендации. Педиатрия / под ред.
А.А.Баранова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005 г.).

2. Регистр лекарственных средств России РЛС.
Энциклопедия лекарств / гл. ред. Г.Л.Вышковс-
кий. - М., 2006. - 14-й вып.- С.245

3. Патент RU 2373949 С1, 27.11.2009, Бюл. № 33

(57) Изобретение относится к медицине, а
именно к дерматологии и аллергологии, и
может быть использовано для лечения острых
хронических аллергических заболеваний кожи
различного генеза.

Задачей изобретения является расширение
номенклатуры противоаллергических препара-
тов для наружного применения, обладающей
адсорбционной способностью.

Технический результат изобретения
заключается в получении средства с
выраженным терапевтическим эффектом при

лечении кожных проявлений аллергических
реакций различной этиологии, в том числе и в
педиатрической практике.

Указанный технический результат
достигается тем, что средство, содержащее
действующее вещество растительного проис-
хождения, согласно изобретению дополни-
тельно содержит в качестве основы тальк,
бентонит и оксид цинка, а в качестве
действующего вещества содержит раствор
сухого экстракта растительного сырья –
листьев череды и корня радиолы розовой в 40%
этанол в соотношении 1:3, при этом
суммарный экстракт получен путем
смешивания порошкообразных сухих водных
экстрактов растительного сырья, взятых в
равных количествах, при следующем
соотношении компонентов, мас. %:

Тальк	70,5
Бентонит	9,2
Оксид цинка	7,3
Раствор сухого суммарного экстракта растительного сырья в 40% этаноле в соотношении 1:3	13,0

Изобретение относится к медицине, а именно к дерматологии и аллергологии, и может быть использовано для лечения острых хронических аллергических заболеваний кожи различного генеза.

Аллергические болезни, связанные с извращением иммунного ответа охватывают, по данным ВОЗ, около 10% населения и колеблются в разных странах и регионах от 1% до 50%. Проведенные в ряде районов страны исследования показали, что в крупных промышленных центрах аллергическими болезнями страдает от 10% до 20% населения, а в сельской местности - всего 2-4%. Особенно настораживает рост заболеваний среди детей [1].

Известен «Деготь березовый», применяющийся для лечения кожных заболеваний (экземы) в виде 10-30% мазей и линиментов [2]. Оказывает дезинфицирующее, инсектицидное и в то же время местно-раздражающее действие, при длительном применении может наблюдаться обострение экзематозного процесса.

Протипом является средство для лечения аллергических заболеваний кожи содержащее в качестве основы тальк, крахмал и оксид цинка, а в качестве действующего вещества раствор сухого экстракта растительного сырья - листьев крапивы, листьев березы, листьев брусники, травы спорыша, травы фиалки, корня солодки, соплодий хмеля в 40% этаноле в соотношении 1:3, при этом суммарный экстракт получен путем смешивания порошкообразных сухих водных экстрактов растительного сырья, взятых в равных количествах, при определенном соотношении компонентов. Средство обладает выраженным терапевтическим эффектом при лечении кожных проявлений аллергических реакций различной этиологии [3].

Задачей изобретения является расширение номенклатуры противоаллергических препаратов для наружного применения, обладающей адсорбционной способностью и

Технический результат изобретения заключается в получении средства с выраженным терапевтическим эффектом при лечении кожных проявлений аллергических реакций различной этиологии, в том числе и в педиатрической практике.

Указанный технический результат достигается тем, что средство, содержащее действующее вещество растительного происхождения, согласно изобретению дополнительно содержит в качестве основы тальк, бентонит и оксид цинка, а в качестве действующего вещества содержит раствор сухого экстракта растительного сырья - листьев череды и корня радиолы розовой в 40% этаноле в соотношении 1:3, при этом

суммарный экстракт получен путем смешивания порошкообразных сухих водных экстрактов растительного сырья, взятых в равных количествах, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Тальк	0,5	7
Бентонит	,2	9
Оксид цинка	,3	7
Раствор сухого суммарного экстракта растительного сырья в 40% этаноле		
в соотношении 1:3	3,0	1

Средство в указанных концентрациях легко наносится и равномерно распределяется на поверхности кожи, обладает выраженной гигроскопичностью, адсорбирует пот и кожное сало, высушивает и обезжиривает поверхность кожи, усиливает испарение и охлаждение кожи, что приводит к сужению сосудов и уменьшению воспаления и зуда.

Характеристика входящих компонентов.

1. Тальк ($4\text{SiO}_2 \cdot 3\text{MgO} \cdot \text{H}_2\text{O}$) — традиционный наполнитель, используемый в производстве лекарственных средств, обладающий скользящим эффектом - очень мелкий белый или слегка сероватый порошок без блеска, запаха и вкуса, пристающий к коже, жирный и скользкий на ощупь, почти нерастворим в воде, кислотах и других растворителях.

Тальк используют Мульводжского месторождения Ишкашимского района, очищенный методом солянокислотного разложения (патент ТЈ № 833), который соответствует требованиям фармакопии и является нетоксичным веществом.

2. Бентонит (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал. Бентонит больше известен как монтмориллонит. Это один из наиболее эффективных и мощных видов целебных глин. Помимо промышленного использования ее активно задействуют в приготовлении различных косметических средств. Бентонитовая глина обладает уникальным свойством производить "электрический заряд" при гидратации. При контакте с жидкостью его электрические компоненты меняются, получая возможность поглощать токсины. Поэтому одна из главных заслуг бентонита — поглощение и вывод токсинов, тяжелых металлов, примесей и химических веществ.

При контакте с водой бентонит быстро набухает и становится похожим на пористую губку, в которую и всасываются токсины. У бентонита - мощный отрицательный заряд, который притягивает положительно заряженные

3. Цинка оксид (ZnO) - мелкий аморфный белый или слегка желтовато-белый аморфный порошок без запаха, нерастворим в воде и спирте, растворим в разведенных минеральных кислотах, а также в уксусной кислоте без выделения пузырьков газа. Обладает противомикробным и подсушивающим действием (Государственная фармакопея СССР / - 8-е изд. - М.: Медгиз, 1946. - с.741).

4. Сухой суммарный экстракт - сухой экстракт официального растительного сырья листья череды - *Bidens tripartita* L.; корни радиолы розовой - *Rhodiola rosea* L.) мелкокристаллический порошок бурого цвета с ароматным запахом, гигроскопичен. Его получают смешиванием сухих водных экстрактов индивидуальных видов лекарственного растительного сырья, взятых в равных количествах и измельченных до порошкообразного состояния. Средство для лечения аллергических заболеваний кожи широкого спектра действия готовят следующим образом. Травы череды (*Bidens tripartita* L.) обладает противовоспалительным, противоаллергическим действием, является кровоочистительным средством благодаря наличию большого количества биологически активных веществ, поэтому широко применяется при кожных заболеваниях, различных формах диатеза, сопровождающихся сыпью аллергического характера, особенно у детей, фурункулезе, ею лечат нейродермиты, экземы, псориаз, себорею головы (перхоть).

Корень радиолы розовой (*Rhodiola rosea* L.) пользуется популярностью и в косметологии: кремы обладают регенерирующим, омолаживающим, питательным эффектом. Поддерживает кожные покровы и увеличивает защиту от неблагоприятного влияния окружающей среды. Они улучшают обменные процессы, задерживают потери влаги, убирают сухость, воспаление и замедляют процессы старения кожи.

Базовые компоненты - оксид цинка, бентонит и тальк тщательно смешивают в ступке в соотношении 10:10:80 до однородной массы (основа). С целью равномерного распределения на основе раствора сухого суммарного экстракта иммобилизацию проводили путем пропитки основы заданным количеством раствора сухого суммарного экстракта в 40% этаноле в соотношении 1:3. Приготовленный таким образом раствор сухого суммарного экстракта равномерно наносили на основу и высушивали в вакуум-сушильном шкафу при температуре 50-60°C.

Для экспериментальной проверки заявляемого средства были приготовлены различные составы прописей присыпки.

Состав присыпки прописи №1, мас. %:

Тальк - 71,5;

Бентонит - 10,1;

Оксид цинка - 10,3;

Смесь сухого лекарственного растительного сырья - 8,1.

В состав данной прописи присыпки лекарственное растительное сырье вводилось в виде смеси сухого сырья, измельченного до состояния порошка, взятого в равных количествах. Однако проведенный биофармацевтический анализ показал, что биологически активные вещества лекарственного растительного сырья и в частности вещества фенольной природы из данной прописи присыпки высвобождаются более медленно и в меньшем объеме.

Состав присыпки прописи №2, мас. %:

Тальк - 71,5;

Бентонит - 10,2;

Оксид цинка - 7,5;

Сухой суммарный экстракт растительного сырья - 10,8.

В состав данной прописи присыпки вводили сухой суммарный экстракт растительного сырья, полученный путем смешивания порошкообразных сухих экстрактов индивидуальных видов лекарственного растительного сырья, взятых в равных количествах.

Данный состав присыпки по данным биофармацевтического анализа также не дает быстрого и полного высвобождения биологически активных веществ (фенольной природы).

Состав присыпки прописи №3, мас. %:

Тальк - 70,5;

Бентонит - 9,2;

Оксид цинка - 7,3;

Раствор сухого суммарного экстракта растительного сырья в 40% этаноле в соотношении 1:3 - 13,0.

В состав данной прописи присыпки сухой суммарный экстракт, полученный путем смешивания порошкообразных сухих экстрактов индивидуальных видов лекарственного растительного сырья, взятых в равных количествах, вводили в виде раствора в 40% этаноле в соотношении 1:3.

Приготовленные растворы сухого суммарного экстракта равномерно наносились на основу-носитель и высушивались в вакуум-сушильном шкафу при $t=50-60^{\circ}\text{C}$, с последующим проведением биофармацевтического изучения процессов высвобождения биологически активных веществ из сорбента.

Из проведенного фитохимического, биофармацевтического и технологического эксперимента был сделан вывод, что оптимальным составом присыпки является пропись №3, отвечающая всем требованиям

Государственной фармакопеи (однородность, биодоступность, микробиологическая чистота), а также хорошо наносится на пораженные

7

участки кожи, обладает гигроскопическими свойствами.

976

8

Таким образом, заявляемое лекарственное средство имеет значительные преимущества: обладает выраженными десенсибилизирующими, противовоспалительными и регенери-

рующими свойствами. Предлагаемое лекарственное средство не дает побочных эффектов, удобно в применении, в том числе и в педиатрической практике.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Средство для лечения аллергических заболеваний кожи, содержащее в качестве основы тальк и оксид цинка, а в качестве действующего вещества раствор сухого экстракта растительного сырья, **отличающийся тем, что** дополнительно содержит в качестве основы бентонит, а в качестве действующего вещества содержит раствор сухого экстракта растительного сырья – листья череды и корень радиолы розовой в 40%-ном этаноле в соотношении 1:3, при

следующем соотношении компонентов, мас. %:

Тальк	70,5
Бентонит	9,2
Оксид цинка	7,3
Раствор сухого суммарного экстракта растительного сырья в 40% этаноле в соотношении 1:3	13,0

Компьютерный набор: Фатхуллаева М.С.

Заказ

Тираж

Подписное

Национальный патентно-информационный центр РТ734042, г. Душанбе,
ул. Айни, 14а