



Республика Таджикистан

(19) **TJ** (11) **981**
(51) **МПК А61 В 17/00**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения** К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

(21) 1801255

(22) 27.11.2018

(46) Бюл.146, 2018

(71) Курбонов К.М. (ТJ); Азиззода З.А.(ТJ);
Назирбоев К.Р. (ТJ).

(72) Курбонов К.М. (ТJ); Азиззода З.А.(ТJ);
Назирбоев К.Р. (ТJ).

(73) Курбонов К.М. (ТJ); Азиззода З.А.(ТJ);
Назирбоев К.Р. (ТJ).

(54) **СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ
ЦИСТОБИЛИАРНЫХ СВИЩЕЙ**

(56) 1. Нартайлаков М.А., Плечев В.В.,
Мушарапов, Д.Р., Лукманова Г.И. Эхинококкоз
печени. Уфа. 2006. 104 с.

(57) Изобретение относится к медицине, а точнее к
хирургии, и может быть использовано для
ликвидации цистобилиарных свищей,
возникающей при эхинококкэктомии из печени.

Поставленная цель достигается выполнением
ликвидации цистобилиарных свищей интраопера-

ционно при выполнении открытой
эхинококкэктомии из печени.

Сущность способа ликвидации цистоби-
лиарных свищей, осуществляется следующим
образом во время операции после выявления
открытой эхинококкэктомии из любого сегмента
печени и обнаружении цистобилиарных свищей,
включающий удаление элементов эхинококковой
кисты из печени при открытой эхинокок-
кэктомии, обработки остаточной полости
антипаразитарными растворами и выявлении
цистобилиарных свищей диаметром до 5мм
ушивают атрауматическими швами во время
операции после выявления цистобилиарных
свищей, с последующим над последнего для
герметичности наложили биопластический
материал Коллост в виде жгутика и дополнительно
ушивали его в фиброзную капсулу несколькими
атравматическими швами.

Изобретение относится к медицине, а точнее к хирургии, и может быть использовано для ликвидации цистобилиарных свищей, возникающей при эхинококкэктомии из печени.

Эхинококкоз печени является тяжелым паразитарным заболеванием, которое до настоящего времени остается серьезной медицинской и народнохозяйственной проблемой не только в регионах с развитым животноводством, к числу которых относится и Таджикистан. Эхинококкоз чаще поражает печень (50-85%), причем у 12-53% больных это сопровождается развитием различных осложнений. Одним из наиболее грозных осложнений эхинококкоза печени является поражение желчных путей, которое по данным ряда авторов встречается в 4,8-55% наблюдений, а послеоперационная летальность при наличии данного осложнения достигает до 4,5-15% случаев. В ближайшем послеоперационном периоде при осложненном эхинококкозе печени часто (10-24% случаев) имеют место типичные осложнения в виде нагноения остаточной полости в печени, формирования наружного желчного свища, механической желтухи, что во многом связано с наличием цистобилиарных свищей, незамеченных и, соответственно, не устраненных во время операций. Поэтому совершенствование методов до- и интраоперационной диагностики вовлечения в патологический процесс желчных путей, а также технических приемов, способных снизить частоту специфических осложнений после эхинококкэктомии, имеет важное значение в лечении больных эхинококкозом печени.

Прототипом является способ ушивания цистобилиарных свищей. [1]. При этом после открытой эхинококкэктомии, удаление элементов эхинококковой кисты из печени, обработки остаточной полости антипаразитарными растворами и выявлении цистобилиарных свищей диаметром до 5мм ушивают атравматическими швами, с последующим над ушитых швов аппликируют пластины Тахо-Комба. Затем дренируют остаточную полость полихлорвиниловой трубкой.

Недостатком этого способа является не надёжность и плохой герметичности ушитого свища, а также риска развития несостоятельности ушитых швов, желчеистечение, желчный перитонит, нагноение остаточной полости.

Цель изобретения - улучшение непосредственных результатов хирургического лечения больных с эхинококкозом печени за счёт ликвидации цистобилиарных свищей.

Поставленная цель достигается выполнением ликвидации цистобилиарных свищей интраоперационно при выполнении открытой эхинококкэктомии из печени.

Способ осуществляется следующим образом: После выполнение открытой эхинококкэктомии из любого сегмента печени удаление элементов эхинококковой кисты из печени и последующем обнаружении цистобилиарных свищей для ликвидации последнего применяли биопластический коллагенный материал Коллост в виде жгутов. Так, после обработки остаточной полости антипаразитарными растворами и выделение имевшего цистобилиарного свища диаметром до 5мм ушиваем несколькими атравматическими швами в последующим над последнего для герметичности наложили биопластический материал в виде жгута и дополнительно ушивали жгута в фиброзную капсулу несколькими атравматическими швами рассасывающими синтетическими материалами. После

тампонирование полости марлевой салфеткой с экспозицией в 2-3 минуты сухо, герметично. В раннем послеоперационном периоде через установленное дренажной трубкой в остаточной полости выделение желчи или других патологических выделенные не наблюдалось.

По предложенной методике эффективно были пролечены 8 больных с эхинококкозом печени с наличием цистобилиарных свищей.

Положительными сторонами предложенного способа являются:

1. Создаётся надёжной и герметичной укрытия свища;
2. Профилактика риска развития несостоятельности швов и быстрое репарации местной ткани за счёт наполнением свищевого хода с биопластическим коллагенным материалом «Коллост»;
3. Профилактика риска возникновения желчеистечения, желчный перитонит и других гнойно-воспалительный процессов;
4. короткий срок восстановления больного.
5. быстрое улучшение качество жизни больного;

Изложенное выше находить своё подтверждение в следующем клиническом наблюдении.

Больной Д., 38 лет. Госпитализировано на проведение оперативного вмешательства с диагнозом «Эхинококковая болезнь. Эхинококкоз печени 7-8 сегментов правой доли печени». После предварительной предоперационной подготовки больного с учетом до- и интраоперационной находкой проведено операция – лапаротомия, открытая эхинококкэктомия из 7-8-го сегмента правой доли печени, ликвидации цистобилиарного свища, дренирование остаточной полости и подпечёчного пространства полихлорвиниловой трубкой выведенной в правой подреберной области.

Швы на рану. В послеоперационном периоде получала соответствующую комплексную консервативную терапию. На 5-е сутки после операции после проведения контрольного ультразвукового исследования удалена подпеченочная дренажная трубка. Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений, заживление первичным натяжением. Из дренажной трубки, которое находилось в остаточной полости выделение желчи или других патологических жидкостей не наблюдалось. На 10-е сутки после контрольного проведения ультразвукового исследования и оценка

биохимических анализов крови, больная выписана домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, предлагаемый способ ликвидации цистобилиарных свищей у больных с эхинококкозом печени улучшает результаты оперативных вмешательств при патологиях гепатобилиарной зоны и уменьшает частоту послеоперационных осложнений – несостоятельности швов, желчеистечение, нагноение остаточной полости, и других ранних послеоперационных осложнений.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ ликвидации цистобилиарных свищей, включающий **удаление элементов эхинококковой кисты из печени при открытой эхинококкэктомии**, обработки остаточной полости антипаразитарными растворами и выявлении цистобилиарных свищей диаметром до 5мм и ушивание атравматическими швами

отличающейся тем, что после выявления цистобилиарных свищей для их герметичности накладывают биопластический **коллагенный** материал Коллост в виде жгутика затем дополнительно ушивают его в фиброзную капсулу.

Компьютерный набор: Фатхуллаева М.С.

Заказ

Тираж

Подписное

Национальный патентно-информационный центр РТ734042, г. Душанбе,
ул. Айни, 14а