

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ  
ВЕДОМСТВО

# (12) **Описание изобретения**

## К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

1

(21) 2201769

(22) 16.12.2022

(46) Бюл. 192, 2023

(71)(73) Абдуллоева С.Н. (ТJ); Мустафокулова Н.И. (ТJ); Рузбойзода К.Р. (ТJ); Эгамназаров Х.Н. (ТJ); Сафаров Б.И. (ТJ); Абдуллозода С.М. (ТJ)

(72) Абдуллоева С.Н. (ТJ); Мустафокулова Н.И. (ТJ); Рузбойзода К.Р. (ТJ); Эгамназаров Х.Н. (ТJ); Сафаров Б.И. (ТJ); Абдуллозода С.М. (ТJ)

(54) **СПОСОБ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ**

(56) 1. Войцеховский В.В., Ландышев Ю.С., Григоренко А.А., Целуйко С.С., Гоборов Н.Д. Множественная миелома. Современные принципы диагностики и лечения // монография. Благовещенск. -2012. - 140 с.

2. Рукавицин О.А., Сидорович Г.И. Множественная миелома и родственные заболевания // - М.: Бином, 2006. - 214 с

(57) Изобретение относится к медицине, а именно к онкогематологии, и может быть использовано для ранней диагностики и определения стадии множественной миеломы (ММ).

Способ включает определение клинико-лабораторных и функциональных методов значений диагностических показателей. Дополнительно определяют возраст, индекс массы тела, уровень общего белка, скорость оседания эритроцитов, уровень эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, липопротеидов высокой плотности, наличие боли в костях, показатели при УЗИ сердца (гипертрофию желудочков) и фракции выброса, уровень артериального давления, скорость клубочковой фильтрации, в качестве прогностического показателя, на основании клинико-лабораторных и

2

функциональных методов значений диагностических показателей, определяемых по 3-х балльной шкале (в зависимости от количества баллов устанавливают вероятность развития множественной миеломы и цифровое значение: при сумме баллов от 9 до 10 – цифровое значение приравнивается к 1 баллу, вероятность развития ММ – 70%; от 11 до 14 – цифровое значение приравнивается к 2 баллам, вероятность развития ММ – 90%; от 15 до 17 – цифровое значение – 3 баллам, вероятность- 99%) и по формуле

$$ММ = (ББД \times ОБ) + (Боль \times Рен) + (ЭР \times СОЭ)$$

где: ММ – множественная миелома; ББД – белок Бенса Джонса; ОБ – общий белок; Рен – рентген; ЭР – эритроциты и СОЭ – скорость оседания эритроцитов,

устанавливают раннюю диагностику ММ, затем на основании всех полученных данных определяют стадию множественной миеломы по формуле:

$$ЦЗ_{ММ} \times \frac{T + Л + В + ИМТ + Са + ЛПВП + СКФ + От + АД + ФВ + ГТЖС}{11}$$

где: ЦЗ – цифровое значение; Т- тромбоцит; Л – лейкоциты; В – возраст; ИМТ – индекс массы тела; Са – кальций; ЛПВП – липопротеидов высокой плотности; СКФ – скорость клубочковой фильтрации; От – отеки; АД – артериальное давление; ФВ – фракции выброса; ГТЖС – гипертрофия желудочки сердца и при получении баллов от 1 до 2 – интерпретируется как 1 стадия развития ММ; от 3 до 4 – как 2 стадия, а от 5 до 6 – интерпретируется как 3 стадия развития ММ.

Изобретение относится к медицине, а именно к онкогематологии, и может быть использовано для диагностики и определения стадии множественной миеломы, у лиц с подозреваемым на поражении костного мозга и костной ткани, сопровождающегося проявлением онкогематологической патологией.

Множественная миелома (Миеломная болезнь, генерализованная плазмацитома, болезнь Рустицкого-Кайлера) - самый частый злокачественный В-лимфопролиферативный гемобластоз. По классификации REAL, миелома относится к лимфоидным опухолям низкой степени злокачественности.

Повышенная резорбция костной ткани приводит к развитию у 20-40% больных ММ гиперкальциемии, которая способствует ухудшению концентрационной способности канальцев, ухудшению гломерулярной фильтрации, вызывает повреждение почек и развитие полиурии.

Поражение почек проявляется в виде парапротеинемического нефроза, протекающего с выраженной протеинурией, наличием гиалиновых, реже зернистых и эпителиальных цилиндров. Часто в моче обнаруживается белок Бенс-Джонса (BJ), выпадающий в осадок при нагревании мочи до 50—60 °С и растворяющийся при дальнейшем кипячении. При ММ свойственно быстрое развитие недостаточности почек.

В 1975 г. Дьюри /Сальмон (Durie/Salmon) была разработана система стадирования ММ. Эта система сопоставляет главные клинические критерии с массой миеломных клеток. В соответствии с критериями Дьюри-Салмона, ММ подразделяют на три стадии в зависимости от содержания М-белка и клеточной опухолевой массы у больных.

В настоящее время в связи с внедрением в клиническую практику новых рентгенорадиологических методов исследования предложена новая система стадирования ММ по данным позитронно-эмиссионной томографии с 18-фтордезоксиглюкозой и магнитно-резонансной томографии (Durie/Salmon PLUS система стадирования).

Прогнозы при множественной миеломе неблагоприятные. Заболевание не имеет радикальных методов лечения. Современные методики позволяют замедлить его прогрессирование и продлить жизнь больного. Сроки жизни зависят от своевременности диагностики и начала лечения [1].

Таким образом, из выше изложенного исходит, что в настоящее время ММ лежит в основе развития ряд заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации и высокой смертности населения. Актуальным остаётся вопросы об оптимизации раннего выявления и стадирования, прогнозирования и определения уровня оказания адекватной целенаправленной специализированной медицинской помощи больных данной категории.

Прототипом является способ диагностики стадии ММ предложенной Дьюри-Салмон, включающий определение уровня гемоглобина (Hb), кальция (Ca), количество парапротеина (М-компонент) (IgG и IgA) в сыворотке крови, выявлении остеолитических очагов при рентгенографии костей, белка Бенс-Джонса в моче и клеточной (опухолевой) массы при морфологическом исследовании костного мозга, а также определения уровня креатинина в сыворотке крови, и выявление выраженности изменений следующих основных показателей множественного миеломы: снижение уровня гемоглобина (ниже 100 г/л), повышение уровня кальция в крови (от нормальных значений), повышение парапротеина (IgG – более 30 г/л и IgA – более 20 г/л), наличие остеолитических очагов (один и более) и белка Бенс-Джонса (более 1 г/сут.), размеров клеточной (опухолевой) массы (от 0,6 кг и более) и повышение уровня креатинина (до 177 ммоль/л и более); при наличии и выраженности изменений указанных основных показателей диагностируют стадии (I, II и III) множественной миеломы [2].

Недостатком способа является то, что данный способ не позволяет определить и диагностировать риска развития ММ. Это обусловлено недостатками способа при выявлении основных показателей для диагностики ММ и тем, что не учитывают комплексно и всесторонне известные дополнительные показатели множественной миеломы, которые необходимы на ранних стадиях диагностировать и определить стадии ММ и в последующем не указаны вероятность развития ММ, на основе которых своевременно выбирать наиболее оптимальное соответствующее комплексное лечение.

Таким образом, известный способ позволяет диагностировать ММ преимущественно у лиц с подозреваемым на поражении костного мозга и костной ткани, сопровождающегося явной онкогематологической патологией.

**Цель изобретения** - улучшение результатов диагностики и лечения больных с ММ за счёт своевременного, раннего диагностику и определения его стадии.

Поставленная цель достигается путём диагностики и определения стадии ММ на основе имеющихся изменений в клинико-лабораторным и функциональным показателям и их оценка по бальной системе.

Способ осуществляется следующим образом: Определяют диагностические показатели клинико-лабораторными и функциональным методами с последующим расчётом прогностического индекса. У пациента в комплексе определяют следующие диагностические параметры: возраст, вес, рост, индекс массы тела (ИМТ), функции печени (общий белок и кальций), скорость оседания эритроцитов (СОЭ), общий анализ крови (эритроциты (Э), тромбоциты (Т), лейкоциты (Л)), остеолитических очагов при рентгенографии костей, наличие боли в костях, сердечные

показатели при УЗИ сердца (гипертрофия желудочков) и фракции выброса (ФВ), артериального давления (АД), липидный спектр –липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), скорость клубочковой фильтрации (СКФ), уровень креатинина, показатели общего анализа мочи – белка Бенса Джонса.

В качестве прогностического показателя, определяющего диагностику ММ, используют определённые клиничко-лабораторные и функциональные методы значений диагностических показателей, которые определяют по определенной трехбалльной шкале (Таблица 1).

**Шкала клинико-лабораторных и функциональных показателей для выявления  
больных с множественной миеломы**

| Индикаторы | Параметры                                                       | Показатели                                           | Значение                     | Баллы |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| ОБЩ        | Возраст                                                         | Возраст                                              | 0-18                         | 0     |
|            |                                                                 |                                                      | 18-54                        | 1     |
|            |                                                                 |                                                      | 55 и более                   | 2     |
|            | Рост                                                            | Рост (кг)                                            | -                            | -     |
|            | Вес                                                             | Вес (кг)                                             | -                            | -     |
|            | ИМТ (ИМТ = ВЕС / РОСТ*РОСТ)                                     | ИМТ (ИМТ = ВЕС / РОСТ*РОСТ)                          | 18-25                        | 0     |
|            |                                                                 |                                                      | 25-30                        | 0     |
|            |                                                                 |                                                      | 30,1-39,9                    | 1     |
|            |                                                                 |                                                      | 40 и более                   | 2     |
|            | Функции печени                                                  | Общий белок                                          | 68 - 75                      | 0     |
|            |                                                                 |                                                      | 86 и более                   | 3     |
|            |                                                                 | Кальций                                              | 2,0-2,5 ммоль/л              | 0     |
|            |                                                                 |                                                      | 2,6-2,8                      | 1     |
|            |                                                                 |                                                      | 2,81 и более                 | 2     |
|            | Показатели воспаления                                           | СОЭ                                                  | 0,0-12,0                     | 0     |
|            |                                                                 |                                                      | 12,0-25,0                    | 1     |
|            |                                                                 |                                                      | 25,0 и более                 | 2     |
|            | Общий анализ крови                                              | эритроциты                                           | Ж (3,7 - 4,7), м (4,5 - 5,0) | 0     |
|            |                                                                 |                                                      | Ж (3,6 - 3,4), м (4,1 - 3,6) | 1     |
|            |                                                                 |                                                      | Ж (3,3 - 2,3), м (3,5 - 2,4) | 2     |
|            |                                                                 | тромбоциты                                           | 180 - 320                    | 0     |
|            |                                                                 |                                                      | 179 - 170                    | 1     |
|            |                                                                 |                                                      | 160 и ниже                   | 2     |
|            |                                                                 | лейкоциты                                            | 4,0 - 9,0                    | 0     |
|            |                                                                 |                                                      | 9,4 - 10,0                   | 1     |
|            |                                                                 |                                                      | 10,1 и более                 | 2     |
|            | Рентген черепа и грудной клетки и другие кости очаги деструкции | Рентген черепа и грудной клетки и другие кости очаги | норма-отсутствие             | 0     |
|            |                                                                 |                                                      | единичные                    | 1     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                       |               |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | деструкции и бес-<br>причинные перело-<br>мы | множественные                         | 2             |   |
|       | Боли в костях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Боли в костях                                | норма                                 | 0             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | ноющие - тер-<br>пимые                | 1             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | нетерпимые -<br>ломающие              | 2             |   |
| ССС   | Сердечные показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | УЗИ сердца (ЭХО)                             | норма                                 | 0             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | гипертрофия<br>правого желу-<br>дочка | 1             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | гипертрофия<br>левого желудоч-<br>ка  | 2             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | гипертрофия<br>обоих желудоч-<br>ков  | 2             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Фракция выброса                              | 60-100%                               | 0             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 40-59                                 | 1             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 20-39                                 | 2             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Уровень АД                                   | Уровень АД                            | менее 130/90  | 0 |
|       | 130/90-179/109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                       | 1             |   |
|       | 180 и более /110<br>и более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                       | 2             |   |
|       | Липидный спектр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ЛПНП                                         | 2,6-3,3                               | 0             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 3,4-4,0                               | 1             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 4,1-4,8                               | 2             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 4,9 и более                           | 3             |   |
| Почки | <div>Формула <u>Кокрофта - Голта</u></div> <div>* Мужчины (норма 100-150 мл/мин):</div> <div>СКФ = <math>\frac{1,23 \times [(140 - \text{возраст (годы)} \times \text{масса тела (кг)}]}{\text{креатинин крови (мкмоль/л)}}</math></div> <div>* Женщины (норма 85-130 мл/мин):</div> <div>СКФ = <math>\frac{1,05 \times [(140 - \text{возраст (годы)} \times \text{масса тела (кг)}]}{\text{креатинин крови (мкмоль/л)}}</math></div> | СКФ                                          | более 90                              | 0             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 30-90                                 | 1             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | менее 30                              | 2             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Креатинин (женщи-<br>ны) мкмол/л             | 36-98                                 | 0             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 99-280                                | 1             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 281 и более                           | 2             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Креатинин (мужчи-<br>ны) мкмол/л             | 40-116                                | 0             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 117-360                               | 1             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | 361 и более                           | 2             |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Общий анализ мочи                            | отёки                                 | Есть          | 0 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                       | Нет           | 2 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Белок Бенса Джонса                    | Отрицательный | 0 |
|       | Положительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                       | 3             |   |

По полученному значению, основываясь на разработанную шкалу, устанавливают раннюю диагностику множественной миеломы по разработанной формуле:

$$MM = (ББД \times ОБ) + (Боль \times Рен) + (ЭР \times СОЭ)$$

*Примечание:*

*ММ – Множественная миелома*

*ББД – Белок Бенса Джонса*

*ОБ – Общий белок*

*Рен – Рентген*

*ЭР – Эритроциты*

*СОЭ – Скорость оседания эритроцитов*

В зависимости от вычисления суммы баллов устанавливается вероятность развития множественной миеломы и цифрового значения (ЦЗ) для определения стадии множественной миеломы, которая производится на основе результатов разработанной шкалы (таблица 2). При получении баллов от 9 до 10 - цифровое значение приравнивается к 1 баллу и с вероятностью развития ММ - 70%; от 11 до 14 - цифровое значение приравнивается к 2 баллам и с вероятностью развития ММ - 90%; от 15 до 17 - цифровое - 3 баллам с вероятностью 99%.

**Таблица 2.**

**Определение вероятности развития множественной миеломы и цифровое значение для последующим определении стадии ММ**

| Баллы | Вероятность развития ММ | Цифровое значение |
|-------|-------------------------|-------------------|
| 9-10  | 70 %                    | 1                 |
| 11-14 | 90 %                    | 2                 |
| 15-17 | 99 %                    | 3                 |

Затем на основании полученных данных (определение цифрового значения) и данных клинико-лабораторных и функциональных показателей согласно разработанной шкале, в частности данных общего анализа крови (тромбоциты, лейкоциты), возраста, индекса массы тела, уровень кальция и липопротеидов высокой плотности, скорость клубочковой фильтрации, наличие или отсутствие отека, показателей артериального давления и сердечные показатели при УЗИ сердца (гипертрофия желудочков) и фракции выброса помощью разработанной формулы определяют стадию множественной миеломы:

$$ЦЗ_{ММ} \times \frac{T + Л + В + ИМТ + Са + ЛПВП + СКФ + От + АД + ФВ + ГТЖС}{11}$$

*Примечание: ЦЗ – цифровое значение*

*Т – тромбоцит;*

*Л – лейкоциты;*

*В – возраст;*

*ИМТ – индекс массы тела;*

*Са – кальций;*

*ЛПВП – липопротеидов высокой плотности;*

*СКФ – скорость клубочковой фильтрации;*

*От – отеки;*

*АД – артериальное давление;*

*ФВ – фракции выброса;*

*ГТЖС – гипертрофия желудочки сердца*

При получении баллов от 1 до 2 – интерпретируется как 1 стадия развития множественной миеломы; от 3 до 4 – как 2 стадия, а от 5 до 6 – интерпретируется как 3 стадия развития множественной миеломы (таблица 3).

**Таблица 3.**

**Определение стадии множественной миеломы**

| Баллы     | Стадии ММ |
|-----------|-----------|
| от 1 до 2 | I         |
| от 3 до 4 | II        |
| от 5 до 6 | III       |

Таким образом, использование данной формулы позволит больным с ММ получить достоверную целесообразную диагностику и стадии развития ММ, а также позволит разработать профилактические мероприятия с целью минимизации риска возникновения ММ и его связанных осложнений.

Следует также отметить, что прогнозируемые выраженности ММ за счёт оценки диагностиче-

ских показателей позволяют своевременно диагностировать развития других сопутствующих заболеваний,

а также способствуют проведению дальнейшего целенаправленного лечения и тем самым выбрать наиболее оптимальное соответствующее комплексное лечение.

По предложенной методике на сегодняшний день эффективно были обследованы, диагностированы и пролечены более 340 больных с ММ.

Положительными сторонами предложенного способа являются:

1. Ранний и своевременный информативный метод диагностики и прогнозирования стадии ММ у людей, относящийся к группе риска.

2. Включает в себя комплексно все параметры показателей клинико-лабораторно-инструментальных методов исследования.

3. Своевременно предупреждать о риске развития болезни или осложнённых форм заболеваний и тем самым профилактика вторичных осложнений.

4. Простота проведения метода, даже в районных условиях.

5. Низкие трудовые и временные затраты на лечение.

6. Быстрое восстановление качества жизни больного.

Изложенное выше находит своё подтверждение в следующем клиническом наблюдении. Больной Д. 57 лет. Обращался в клинику и после осмотра врача онкогематолога и проведения комплекса клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования в результатах получены следующие данные: возраст 57 лет (согласно разработанной шкале составляет 2 балла), индекс массы тела составляет в пределе 38 (2 балла), уровень общего белка – 89 г/л (3 балла), уровень кальция – 2,84 (2 балла), СОЭ – 26 (2 балла), показатели общего анализа крови – эритроциты –  $3,4 \times 10^{12}/л$  (2 балла), лейкоциты –  $10,5 \times 10^9/л$  (2 балла), тромбоциты – 156 (2 балла), при рентгенографии костей имеется 3 остеолитических очагов (2 балла), жалуется на нетерпимые – ломающие боли в костях (2 балла), при УЗИ (ЭХО) – серд-

ца имеется картина гипертрофия левого желудочка (2 балла), фракция выброса – 35% (2 балла), артериальное давление 190 на 110 мм.рт.ст. (2 балла), уровень триглицерида – 5,9 (2 балла) и липопротеидов высокой плотности – 4,5 (2 балла), скорость клубочковой фильтрации 27 (2 балла), уровень креатинина – 367 мкмоль/л, наличие отёков нет (2 балла), белок Бенс-Джонсона обнаружена в моче (3 балла).

В зависимости от вычисления суммы баллов согласно разработанной формулы для установления вероятности развития множественной миеломы и цифрового значения (ЦЗ) следующее:

$$MM = (3 \text{ балла} \times 3 \text{ балла}) + (2 \text{ балла} \times 2 \text{ балла}) + (2 \text{ балла} \times 2 \text{ балла})$$

Сумма баллов составляет 17 баллов, при этом цифровое значение приравнивается к 3 и с вероятностью развития ММ – 99%.

Затем на основании полученных данных, т.е. определение цифрового значения, где составляло - 3 с использованием некоторых данных клинико-лабораторных и функциональных показателей с помощью разработанной формулы определяли стадию ММ:

$$3 \times (2 \text{ балла} + 2 \text{ балла} + 2 \text{ балла} + 2 \text{ балла} + 2 \text{ балла} + 2 \text{ балла} + 2 \text{ балла} + 2 \text{ балла} + 2 \text{ балла} + 2 \text{ балла}) / 11 = 6 \text{ балла.}$$

Результат вычисления баллов с учетом разработанной формулы – 6 баллов, где соответствует к 3 стадии ММ.

После ранней диагностики и определения 3 стадии ММ пациент для проведения адекватной и своевременной специализированной терапии в специализированной отделении, а именно отделении онкогематологии госпитализировано.

### Формула изобретения

Способ ранней диагностики и определения стадии множественной миеломы (ММ), включающий определение уровня кальция, выявление остеолитических очагов при рентгенографии костей, белка Бенс-Джонса в моче, определение уровня креатинина в крови и диагностирование множественной миеломы в зависимости от выраженности изменений показателей, отличающийся тем, что дополнительно определяют возраст, индекс массы тела, уровень общего белка, скорость оседания эритроцитов, уровень эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, липопротеидов высокой плотности, наличие боли в костях, показатели при УЗИ сердца (гипертрофию желудочков) и фракции выброса, уровень артериального давления, скорость клубочковой фильтрации, в качестве прогностического показателя, на основании клинико-лабораторных и функциональных методов значений диагностических показателей, определяемых по трехбалльной шкале в зависимости от количества баллов устанавливают вероятность развития множественной миеломы и цифрового значения: при

сумме баллов от 9 до 10 - цифровое значение приравнивается к 1 баллу, вероятность развития ММ - 70%; от 11 до 14 - цифровое значение приравнивается к 2 баллам, вероятность развития ММ - 90%; от 15 до 17 - цифровое значение - 3 баллам, вероятность - 99%) и по формуле

$$MM = (ББД \times ОБ) + (Боль \times Рен) + (ЭР \times СОЭ)$$

где: ММ - множественная миелома; ББД - белок Бенс-Джонса; ОБ - общий белок; Рен - рентген; ЭР - эритроциты и СОЭ - скорость оседания эритроцитов, устанавливают раннюю диагностику ММ, затем на основании всех полученных данных определяют стадию множественной миеломы по формуле:

$$ЦЗ_{ММ} \times \frac{T + L + B + ИМТ + Ca + ЛПВП + СКФ + От + АД + ФВ + ГТЖС}{11}$$

где: ЦЗ – цифровое значение; Т- тромбоцит; Л – лейкоциты; В – возраст; ИМТ – индекс массы тела; Ca – кальций; ЛПВП – липопротеидов высокой плотности; СКФ – скорость клубочковой фильтрации; От – отеки; АД – артериальное давление; ФВ –

фракции выброса; ГТЖС – гипертрофия желудочки сердца и при получении баллов от 1 до 2 – интерпретируется как 1 стадия развития ММ; от 3 до 4 – как 2

стадия, а от 5 до 6 – интерпретируется как 3 стадия развития ММ.

Компьютерный набор: Нигораи А.

---

|                                                                                 |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Заказ                                                                           | Тираж | Подписное |
| Национальный патентно-информационный центр РТ 734042, г. Душанбе, ул. Айни, 14а |       |           |