



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения** К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

1

(21) 2301882
(22) 29.09.2023
(46) Бюл. 207, 2024
(71)(73) Государственное образовательное учреждение "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино", Уроков Комрон Зокирович, Ходжиева Гулнора Бобоевна (TJ)
(72) Уроков К.З. (TJ); Шкляев А.Е. (RU); Ходжиева Г.Б. (TJ); Шамсов А.Т. (TJ); Шоназарова М.А. (TJ); Махмадов М.И. (TJ)
(54) **СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДИАРЕИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ МИЕЛОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ НА ФОНЕ АГРАНУЛОЦИТОЗА**
(56) 1. www.msmanuals.com;
2. Патент РФ N 2008001, 04.06.1992;
3. Справочник Видаль.- Лекарственные препараты в России: Справочник.- М.: АстраФармСервис.- 1998.- 1600с.);
4. Патент РФ №2137495, 20.09.1999
5. DuPont H.L., Ericsson C.D., Johnson P. C.et al. Prevention of traveler's diarrhea by the tablet formulation of bismuth subsalicylate // JAMA. - 1987. - Vol. 257. - P. 1347-1350.
(57) Изобретение относится к области медицины, а именно к способу профилактики и лечения осложне-

2

ний при химиотерапии больных с острым лейкозом, и может быть использовано в онкологии для снижения травматичности химиотерапии.

Целью изобретения является создание способа профилактики острой диареи у пациентов с острым миелобластным лейкозом на фоне агранулоцитоза.

Поставленная цель достигается способом профилактики и лечения диареи у пациентов с острым миелобластным лейкозом на фоне агранулоцитоза, включающий химиотерапию и введение лекарственных средств, причем в качестве лекарственных средств назначают внутривенное введение глутатиона – РАМ 600 5 мл 2 раза в день в течение 10 -12 дней и двухкратный прием водной настойки из семян льна, корня одуванчика, шалфея лекарственного, алтея лекарственного, девясила, при следующем содержании компонентов, мас. %:

семена льна -20
корень одуванчика-20
шалфей лекарственный - 30
алтей лекарственный - 20
девясил-10

Причем разовая доза настойки составляет 100 мл за 30 мин до еды в течение всего периода химиотерапии.

Формула изобретения

1. Способ профилактики и лечения диареи у пациентов с острым миелобластным лейкозом на фоне агранулоцитоза, включающий химиотерапию и введение лекарственных средств, отличающийся тем, что дополнительно в качестве лекарственных средств назначают внутривенное введение глутатиона – РАМ 600 5 мл 2 раза в день в течение 10-12 дней и двухкратный прием водной настойки из семян льна, корня одуванчика, шалфея лекарственного, алтея лекарственного и девясила, при следующем содержании компонентов, мас. %:

семена льна -20
корень одуванчика-20
шалфей лекарственный - 30
алтей лекарственный - 20
девясил-10

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что разовая доза настойки составляет 100 мл за 30 мин до еды в течение в течение всего периода химиотерапии.

Компьютерный набор: Ризоева С.Р.

Заказ	Тираж	Подписное
Национальный патентно-информационный центр РТ 734042, г. Душанбе, ул. Айни, 14а		