



Республика Таджикистан

(19) **TJ** ⁽¹¹⁾ **1699**
(51) **МПК А61В17/00;**
А61К33/06; А61Р31/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения**

К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

1

(21) 2502195

(22) 27.11.2025

(46) Бюл. 230, 2026

(71) Назаров Шохин Кувватович (ТJ); Шарифзода
Суннатулло Ахмад (ТJ).

(72) Назаров Шохин Кувватович (ТJ); Шарифзода
Суннатулло Ахмад (ТJ).

(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ НАГНОИВШИХСЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

(56) Изобретение относится к области медицины, а именно к разделу хирургии гнойных осложненных ран, в частности послеоперационных раневых осложнений, и предназначено для лечения нагноившихся послеоперационных ран передней брюшной стенки, профилактики грыже образования, предотвращении деформирующих и келоидных рубцов.

2

Сущность изобретение заключается в том, что после обработки краёв гнойной раны антисептическим препаратом с использованием 96⁰ С - спирта, полость и дно раны промывают раствором сульфата магния, затем, рану, повторно сушат на всём протяжении, дополнительно наносят тонкий слой сухого порошка сульфата магния путём припудривания, устанавливают на дне раны заранее смоченные в растворе сульфата магния марлевые ленты, затем размещают резиновые дренажные полоски и закрывают рану асептической повязкой.

Предлагаемое изобретение обеспечивает удобство и эффективность в лечении сложных послеоперационных ран, помогает предотвращать развитие грыж и минимизировать риск формирования деформирующих и келоидных рубцов.

Формула изобретения

Способ лечения нагноившихся послеоперационных ран передней брюшной стенки, включающий обработку краёв гнойной раны антисептическим препаратом, промывание гнойной раны раствором перекиси водорода H_2O_2 , высушивание раны, **отличающийся тем, что** после обработки краёв гнойной раны антисептическим препаратом с использованием 96° С - спирта, полость и дно раны промывают раствором сульфата магния, затем,

рану, повторно высушивают на всём протяжении, дополнительно наносят тонкий слой сухого порошка сульфата магния путём припудривания, устанавливают на дне раны, заранее смоченные в растворе сульфата магния марлевые ленты, затем размещают резиновые дренажные полоски и закрывают рану асептической повязкой.

Компьютерный набор: Газиев М.

Заказ	Тираж	Подписное
Национальный патентно-информационный центр РТ 734042, г. Душанбе, ул. Айни, 14а		