



Республика Таджикистан

(19) **TJ** (11) **166**

(51) **МПК(2006) А 61 В**
17/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения**

К МАЛОМУ ПАТЕНТУ

1

(21) 0700155
(22) 04.12.2007
(46) Бюл.51 (3), 2008
(71) Шерназаров И.Б. (ТJ); Азизов А.А. (ТJ);
Ахмедов Р.Ш. (ТJ); Хакимова Н.И. (ТJ).
(72) Шерназаров И.Б. (ТJ); Азизов А.А. (ТJ);
Ахмедов Р.Ш. (ТJ); Хакимова Н.И. (ТJ).
(73) Шерназаров И.Б. (ТJ); Азизов А.А. (ТJ);
Ахмедов Р.Ш. (ТJ); Хакимова Н.И. (ТJ).
(56) 1. Р.Д. Синельников «Атлас анатомии человека» том.3 Москва. Мед. Изд. 1979г. Стр. 436.
(54) СПОСОБ ПОДВЗДОШНОЙ ЛИМФОТРОПНОЙ
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОМ ГЕМАТО-

2

ГЕННОМ ЭПИФИЗАРНОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ У НО-
ВОРОЖДЕННЫХ

(57) Изобретение относится к медицине, а именно
детской хирургии.

Предложенный способ подвздошной лимфотропной антибиотикотерапии при острой гематогенной эпифизарной остеомиелите у новорожденных заключается в том, что по наружной поверхности крыла подвздошной кости вводится иголка одноразового применения с введением 0,25% раствора новокаина проводится микроирригатор (подключичный катетер №0,6) непосредственно в близи поражения и в проекции лимфатических сосудов и узлов.

Изобретение относится к медицине, а именно детской хирургии.

Предложенный способ является новым, простым, доступным и избавляет маленьких больных детей от грозных осложнений, как вывихи и патологических переломах.

Цель настоящего изобретения является внедрения нового, простого и эффективного способа для лечения острого гематогенного эпифизарного остеомиелита у новорожденных.

Цель достигается тем, что используется микроиригатор (подключичный катетер №0,6) для лимфотропной антибиотикотерапии при острой гематогенной эпифизарной остеомиелите у новорожденных.

Способ осуществляется следующим образом:

по наружной поверхности крыла подвздошной кости, вводится игла одноразового применения. Игла должна проходить по надкостнице с введением 0,25% раствора новокаина. При появлении мутного экссудата или гноя, следует вскрыть и дренировать гнойный очаг. Вставляется микроиригатор для введения антибиотиков (фиг. 1). Антибиотики вводятся в зависимости от чувствительности микрофлоры 1 раз в сутки разовая доза. Данный способ применим у 5-ти больных детей, которое отмечались быстрое снижения температуры, улучшения общего состояния больных, уменьшения отека подвздошных и паховых лимфоузлов (фиг. 2).

Таким образом: способ является новым, простым и эффективным. Применен у 5-ти больных результаты были положительными.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ подвздошной лимфотропной антибиотикотерапии при остром гематогенном эпифизарном остеомиелите у новорожденных, заключающийся в том, что по наружной поверхности крыла подвздошной кости, по надкост-

нице, вводят иглу одноразового применения и вводят 0,25% раствор новокаина, вставляют микроиригатор (кубитальный катетер) непосредственно вблизи поражения и 1 раз в сутки вводят разовую дозу антибиотиков.

Компьютерный набор: Назарова Дж.


Заказ

Тираж

Подписное

Национальный патентно-информационный центр РТ

СПОСОБ ПОДВЗДОШНОЙ ЛИМФОТРОПНОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОЙ ГЕМАТОГЕННОЙ ЭПИФИЗАРНОЙ ОСТЕОМИЕЛИТЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ.



Фиг.1. Лимфатические сосуды и узлы (поясничные и подвздошные)

Фиг.2. Внебрюшинное прексокральные и эндолимфатические антибиотикотерапия